

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ (БАД) К ПИЩЕ «БИММУНАЛ-9»

не является лекарственным средством

ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ: БИММУНАЛ - 9[®], BИMМУNAЛ - 9[®]

СОСТАВ: 100 мл раствора для применения внутрь содержат:

Вода дистиллированная - 98 мл	<i>микроэлементы (не более):</i>	
Йодорганическое соединение - 0.5 - 1.0 %	Цинк (хлорид цинка) -	0.03 мг
<i>природные моно-олиго-полисахариды:</i>		
декстран - 0.3 мг	Кобальт (хлорид кобальта) -	0.001 мг
амилоза - 0.3 мг	Медь (хлорид меди) -	0.01 мг
амилопектин - 0.3 мг	Марганец (хлорид марганца) -	0.01 мг
	Железо (хлорид железа) -	0.01 мг
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ: в 100 мл продукта - 58 ккал		

НАЗНАЧЕНИЕ: Профилактика йодной недостаточности и заболеваний, связанных с этой патологией, обладает иммуномодулирующим, иммунокорректирующим и адаптогенным действием.

ОПИСАНИЕ: Сироп для внутреннего и наружного применения.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ: Обусловлено положительным воздействием на пролиферирующие клетки щитовидной железы. Способствует активной выработке щитовидной железой биологически активных гормонов, влияющих на множество физиологических функций организма. Комплекс микроэлементов усиливает действие препарата.

Йод - повышает иммунитет против инфекционных и профессиональных заболеваний, снимает мышечные боли, устраняет поясничный радикулит, нормализует артериальное давление, стимулирует рост и умственные способности детей, предупреждает заболевания нервной системы, половых и молочных желез.

Железо - важнейший микроэлемент, принимающий участие в кроветворении, дыхании, окислительно-восстановительных реакциях и иммунобиологических процессах.

Медь - способствует снабжению клеток кислородом, участвует в образовании эритроцитов и гемоглобина, помогает в усвоении белков и углеводов, увеличивает активность инсулина, повышает иммунитет.

Цинк - благотворно влияет на физическое развитие и репродуктивную функцию человека.

Кобальт - стимулирует процесс кроветворения, участвует в синтезе белков, в том числе ферментных, регулирует углеводный обмен, влияя на обмен веществ. но важнейшая роль кобальта состоит в эндогенном синтезе витамина **B12** (цианокобаламина).

Марганец - участвует в синтезе и обмене нейромедиаторов в нервной системе; препятствует свободно-радикальному окислению, обеспечивает стабильность структуры клеточных мембран; обеспечивает нормальное функционирование мышечной ткани; участвует в обмене гормонов щитовидной железы (тироксин); обеспечивает развитие соединительной ткани, хрящей и костей; усиливает гипогликемический эффект инсулина; повышает гликолитическую активность; повышает интенсивность утилизации жиров; снижает уровень липидов в организме; противодействует жировой дегенерации печени; участвует в регуляции обмена витаминов **С**, **Е**, группы **В**, холина, меди; участвует в обеспечении полноценной репродуктивной функции; необходим для нормального роста и развития организма.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА: «БИММУНАЛ-9» способствует укреплению иммунитета. Обладает адсорбирующим, детоксикационным, обволакивающим, связующим, ранозаживляющим, противоаллергическим, фотозащитным, обогащает организм микроэлементами, улучшает обмен веществ.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ:

Употребление внутрь:

- * **кишечные инфекции** (сальмонеллез, дизентерия, холера, лептоспироз и др.);
- * **пищевые интоксикации** (ботулизм, отравления грибами, рыбой и пр.);
- * **профилактика желудочно-кишечного тракта** (гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, воспаления печени, поджелудочной железы);
- * **дисбактериозы различной этиологии;**
- * **аллергические заболевания** (пищевая и лекарственная аллергия, зуд, крапивница, экссудативный диатез и др.);
- * **профилактика и комплексное лечение эндокринной системы** (диффузный токсический зоб);
- * **профилактика и комплексное лечение нервной системы** (синдром хронической усталости, астеническое состояние и др.);
- * **нарушение обмена веществ** (дерматит, экзема, псориаз, остеопороз и др.);
- * **профилактика и комплексное лечение легких и верхних дыхательных путей;**
- * **гинекология** (токсикоз беременных, вагинальный кандидоз, кольпиты и др.);
- * **онкология** (интоксикация при онкологических заболеваниях, диарея, эндотоксикоз на фоне химио = и лучевой терапии);
- * **нефроурология** (хроническая почечная недостаточность, пиелонефрит);
- * **отравления** (пищевые, алкогольные, химические, медикаментозные);
- * **постинфекционные состояния** (устранение негативного состояния при антибиотикотерапии, заболеваниях ОРВИ, ОРЗ, гриппе);
- * **профзаболевания** (сопряженные контакты с солями тяжелых металлов, свинцовой и цинковой пылью, ионизирующим излучением, другими компонентами химического производства).

При наружном применении:

- * **дерматология** (дерматиты, чесотка, трофические язвы, фурункулы);
- * **аллергология** (зуд, крапивница, диатез);

- * повреждение кожного покрова (пролежни, укусы насекомых, термические, химически и солнечные ожоги, гнойные образования, опрелости, раны предоперационные и постоперационные);
- * гинекология (эрозия шейки матки, вагинальный кандидоз, кольпиты);
- * насморк, конъюнктивиты (аллергического происхождения, ОРЗ, ОРВИ);
- * косметология (удаление угревой сыпи, и др.);
- * терапия аутоиммунных заболеваний (системная красная волчанка).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Индивидуальная непереносимость йода; заболевания, при которых противопоказаны препараты йода (нефрит, геморрагический диатез); кормящим и беременным женщинам рекомендуется проконсультироваться с врачом.

СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКИ:

Категория:	Профилактическая схема применения:	Примечание:
Дети 1 года до 3 лет	1 капля на 50 мл воды. Принимать за 30мин до еды 1 раз в день. Или 1 капля на 0,5 литра воды. Употребить в течение дня.	При употреблении кормящей мамой препарата, ребенку принимать необязательно
Дети 3 до 7 лет	1-2 капли на 50-70мл воды. Принимать за 30 минут до еды 1 раз в день. Или 1-2 капли на 0,5 литра воды. Употребить в течение дня.	При заболевании, дозировку можно увеличить до 1/2 чайной ложки
Дети от 7 до 16 лет	1-3 капли на 50-70мл воды. Принимать за 30 минут до еды 1 раз в день. Или 1-3 капли на 0,5 литра воды. Употребить в течение дня.	При заболевании, дозировку можно увеличить до 1 чайной ложки.
Взрослые	1-10 капель и более на 50-100мл воды. Принимать за 30мин до еды 1 раз в день.	
Беременные / кормящие женщины	Беременным не рекомендуется в первый триместр (если ранее не применяли). Применять начиная с 12-й недели, пить с 1 до 5 капель ежедневно.	Кормящим пить по 3-5 капель весь период кормления ежедневно.
Пожилые	1-5 капель на 50-70мл воды. Принимать за 30 минут до еды 1 раз в день. Или 1-2 капли на 0,5 литра воды. Употребить в течение дня.	При заболевании, дозировку можно увеличить до 1 чайной ложки.

Примечание! При заболевании дозировка может быть увеличена до 1-2 ложек. Необходимо проконсультироваться с лечащим врачом или со специалистом по телефону «горячей линии»: +7 925 478 7635

При внутреннем применении - «БИМунал-9» рекомендуется разводить чистой или остывшей кипяченой водой.

В профилактических целях необходимо принимать 1-2 раза в месяц по 1-ой мерной ложке на 0,5 стакана остывшей кипяченой воды за 40-60 минут до еды. Дозы и длительность приема зависят от особенностей заболевания от 10 до 50 дней. Через каждые 10 дней рекомендуется делать перерыв на 5 дней.

При наружном применении - Нежными круговыми движениями нанести «БИМунал-9» на участки поражения с захватом здоровых областей, через 10-15 минут смыть теплой водой или воспользуйтесь влажной салфеткой для лица. 1-2 раза в сутки, в течение всего курса лечения до полного заживления.

Полоскание горла - «БИМунал-9» необходимо развести чистой или остывшей кипяченой водой в соотношении половина чайной или мерной ложки на 0,5 стакана воды, 3 раза в день после приема пищи.

Капли в нос - «БИМунал-9» необходимо развести остывшей кипяченой водой в соотношении 1:70(1 капля на столовую ложку воды), закапывать 2-3 раза в сутки. Приготовленный раствор не теряет своих свойств в течении суток, при комнатной температуре в защищенном от света месте.

Капли в уши – 3 капли на чайную ложку теплой воды 2 раза в день.

Схема ингаляционного применения препарата Биммунал 9 (компрессионным небулайзером)

1-3 капли на 5 мл физраствора или чистой воды от 1 до 3 раз в день в течении 10 дней.

Для профилактических целей, применять 2 раза в неделю.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ: «БИМунал-9» необходимо применять в интервале не менее 4 часов до приёма других лекарств.

ФОРМА ВЫПУСКА: Флаконы темного стекла и пластика емкостью 100 мл. Перед каждым употреблением препарат взбалтывать.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: «БИМунал-9», выдерживать УНИВЕРСАЛЬНУЮ схему приема:

Дни	Дозировка, кратность	Взаимодействие с другими лекарственными формами.
2 дня	5 капель на 1/3 стакана воды за 30 мин. до приема пищи один раз в день	Интервал не менее 4 часов
2 дня	10 капель на 1/3 стакана воды за 30 мин. до приема пищи один раз в день	
2 дня	20 капель на 1/2 стакана воды за 30 мин. до приема пищи один раз в день	
2 дня	30 капель на 1/2 стакана воды за 30 мин. до приема пищи один раз в день	
2 дня	50 капель на 1/2 стакана воды за 30 мин. до приема пищи один раз в день	

5 дней перерыв;

10 дней По 1 мерной ложке за 30 мин. до еды один раз в день на 1/2 стакана воды ежедневно **5 дней перерыв;** Интервал не менее 4 часов

10 дней По 1 мерной ложке за 30 мин. до еды один раз в день на 1/2 стакана воды ежедневно Интервал не менее 4 часов

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: При комнатной температуре в защищенном от света месте. Хранить в недоступном для детей месте.

СРОК ГОДНОСТИ: 2 года. Не использовать после истечения срока годности.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК: Без рецепта врача.

Препарат зарегистрирован в Республике Казахстан. Регистрационное удостоверение: № KZ.16.01.78.003.E.013068.06.11 от 20.06.2011года. СТ 30273 – 1910 – ТОО - 01 - 2007

Производитель:

ТОО «Стеко ЛТД»

Адрес: 050040, Республика Казахстан

г. Алматы, ул. Тимирязева, 30

www.stekoltd.kz

e-mail: cteko@mail.ru **тел.:** +7 (727) 327 15 57 **тел.:** +7 (702) 111 96 10

fax: +7 (727) 319 58 20

Дистрибьютор в Российской Федерации: тел.: +7 (925) 47 - 87 - 637

www.zdravyiod.ru

Горячая линия продукции "БИММУНАЛ" в РФ: тел.: +7 (925) 47 - 87 - 635



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Комитет по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики
Казахстан
Заместитель Председателя Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной
экономики Республики Казахстан

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ KZ.16.01.95.003.E.005422.12.15 от 23.12.2015 г.

Продукция:

Биологически активная добавка к пище "Биммунал 9". Изготовлена в соответствии с документами: СТ ТОО 30303057-01-2007. Изготовитель (производитель): ТОО "Стеко ЛТД", 050040, г. Алматы, ул. Тимирязева, 30 в/ч 31442, Казахстан. Получатель: ТОО "Стеко ЛТД", 050040, г. Алматы, ул. Тимирязева, 30 в/ч 31442, Казахстан.

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", утв. Реш. КТС от 09.12.2011 г. № 880;
ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", утв. Реш. КТС от 09.12.2011 г.

№ 881

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Биологически активная добавка к пище рекомендуется в качестве дополнительного источника йода. (далее согласно приложению)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний от 06.11.2015 г. № 1476Р ИЛ ТОО "НУТРИТЕСТ", научный отчет производителя и экспертное заключение экспертного совета по регистрации биологически активных добавок к пище, детского питания, пищевых добавок и др. от 14.11.2015 г. № 05/ЭК-0169-15.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица,
выдавшего документ, и печать органа (учреждения),
выдавшего документ

Н. Абди

(Ф.И.О. / подпись)



№ 0026426